

376. pl. 13. f. 3. 4. — 2. *M. brevicula* p. 378. pl. 13. f. 5. — 3. *M. adumbrata* p. 379. pl. 13. f. 6. — 4. *Subeulima* n. gen. p. 380, *Lamberti* pl. 13. f. 2.

— Beschreibung neuer Arten; von Souverbie.
— 1. *Turbinella Crosseana* p. 382. pl. 13. f. 1. — *Scalenostoma apiculatum* p. 383 von Mauritius.

— Beschreibung neuer Arten von Guatemala; von Crosse und Fischer. — 1. *Streptostyla Sargi* p. 384. pl. 11. f. 1. 1a. — 2. *Melania Sargi* p. 385. pl. 11. f. 4.

— Beschreibung zweier neuen Arten; von Crosse.
— 1. *Ennea Dupuyana* p. 387. pl. 11. f. 2 von den Comoren. (Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, dass die fast gleichzeitig, kaum etwas später, beschriebene *E. quadridentata* Mart. dieselbe Art ist. Siehe *Pfr. Mon. Hel.* VIII. p. 602.) — 2. *Planorbis Bavayi* p. 388. pl. 11. f. 3 von Guadeloupe.

— Bibliographie. — Pfeiffer *Mon. Helic.* VIII. Fasc. 2. 1876. — Brusina Aggiunte alla Monografia delle Campylaea della Dalmazia e Croazia 1876. — Brusina Cenno sugli Studj naturali in Dalmazia (Foss. terziari.) 1875. — H. Strebel Beitrag zur Kenntniss der Fauna mexicanischer Land- und Süßsw. Conch. Th. 2. 1875.

— Correspondenz. — Entdeckung der *Amphibulima patula* Brug. auf der kleinen Insel Marie-Galante bei Guadeloupe; von Hrn. Mazé.

Neuigkeit. — *Trigonia acuticostata* lebend in der Meerenge Bass erlangt; von M' Coy.

Proceedings of the Zoological Society of London 1876. (Forts. von S. 196.)

Part. I. (Jan. 18.) Ueber die Landschnecken von Taviuni, Feejee Inseln, nebst Beschreibung neuer Arten; von E. A. Liardet p. 99. pl. 5. — Einige Arten von

dieser Insel sind bereits von Garrett 1872 beschrieben, nämlich *Helix Tavinniensis* und *Hoyti*. Die Insel wird von diesem Autor Tavinni genannt, doch scheint dies ein (mehrfach wiederholter) Druck- oder Schreibfehler zu sein, da schon im Cat. Mus. Godeffr. diese Schreibart in Taviuni verändert ist. Diese früher beschriebenen Arten werden gar nicht erwähnt, sondern von schon bekannten nur *H. casca* Gould. Dagegen werden als neu eine Anzahl von kleinen Arten durch kurze und ungenügende englische Phrasen ohne Maasangabe charakterisirt, doch durch die Abbildungen allenfalls kenntlich gemacht. Es sind folgende: *Nanina? Taviuniensis* p. 99. f. 1. 1a. b; *Nanina? vitrinina* p. 100. f. 2. 2a; *Nanina? Ramsayi* p. 100. f. 3 (*Helix Ramsayi* Cox 1868 gehört wohl zu *Patula*); *Helix Princei* p. 100. f. 4. 4a; *Helix Pimocki* p. 100. f. 5. 5a; *Helix Barkasi* p. 100. f. 6; *Helix Clayi* p. 101. f. 7; *Lamellaria perforata* p. 101. f. 8. 8a; *Diplommantina Taviensis* p. 101. f. 9. 9a; *Lagocheilus hispidus* p. 101. f. 10. 10a; *Omphalotropis Vitiensis* p. 101. f. 11. 11a.

Febr. 15. Beschreibung von 4 neuen *Helix*-Arten; von G. French Angas. Dazu Tafel 20. — 1. *Helix Beatrix* p. 265. f. 1—5. Eine mit *H. meta* Pfr. verwandte sehr veränderliche Art von den Salomons-Inseln. — 2. *H. Ramsdeni* p. 266. f. 6. 7 ebendaher? Mit *H. Boivini* verglichen, wohl noch näher an *H. congrua* Pfr. — 3. *Helix Moresbyi* p. 267. f. 8. 9 von Port Denison, Queensland. Mit *H. Yulei* Forb. verglichen, aber einigen anderen von Cox beschriebenen Arten viel ähnlicher. — 4. *Helix rhoda* p. 267. f. 10—12 von San Christoval, Salomon's Inseln. Zu *Trochomorpha* gezählt als nächste Verwandte der *Merziana*. — Hinzugefügt werden Bemerkungen über *Helix Angasiana* Pfr., welche Cox trotz der im Journ. Conch. gegebenen Berichtigungen verkannt habe. *Helix Angasiana* hat im frischen Zustande Binden, ähnlich der *H. bitaeniata* Cox, welche

übrigens Synonym der 1863 auch nach einem ausgebleichten Exemplar beschriebenen *H. Flindersi* Ad. & Ang. sei, was man den Beschreibungen nach nicht vermuthen konnte. — *H. Angasiana* wird deshalb f. 13. 14 und *bitaeniata* f. 15. 16 nochmals abgebildet.

Part III.

6. Jun. Beschreibung von 5 neuen Helix-Arten; von H. Adams und G. French Angas. Dazu Taf. 47.

1. *Helix Mulantensis* p. 488. f. 1 — 3 von den Malanta-Inseln, Salomon's Archipelagus. Mit *H. Guadalcanarensis* Cox verglichen. — 2. *H. Comriei* p. 489. f. 4. 5. Verwandt mit *Bruneriensis* Forb. — 3. *H. Robilliardi* p. 489. f. 6. 7, von Madagascar. — 4. *H. Feneriffensis* p. 489. f. 8. 9 von Feneriffa-Insel, Nordwest von Madagascar, eine scharfgekielte Nanina? (*Hemiplecta*?) — 5. *H. Eyrei* p. 490. f. 10—12 von Lake Eyre in Centralaustralien. Mit *H. cyrtopleura* Pfr. und *Philipsiana* Ang. verwandt und ebenfalls der Section *Angasella* zugezählt. Pfr.

Rossmüssler Iconographie der Land- u. Süßwassermollusken; fortgesetzt von Dr. W. Kobelt.

Band IV. Zweite Lieferung 1876. Mit Tafel 96—110. (S. Malak. Bl. 1875. S. 210—213.) Dritte Lieferung 1876. Mit Tafel 111—120.

Die zweite Lieferung beginnt (S. 13) mit einer ausführlichen Erörterung der *H. desertorum* Forsk., zu welcher, abweichend von der früher vom Verfasser gegebenen Anschauung (Katalog 1871. S. 19) auch *H. arabica* und *Ehrenbergi* Roth, die damals noch als eigene Arten der Gruppe *Eremophila* *) aufgezählt waren, zu

*) Die Gruppe muss wohl den von mir schon 1855 vorgeschlagenen Namen *Eremina* behalten, um so mehr, da R. Brown schon 1810 eine Gattung *Eremophila* unter den Myoporaceen beschrieben hat.